Theoretische Informatik – Übung Gruppe 4

Roman Langrehr

Reduzierbarkeit

Idee:

- Buch: $L_{\text{diag}} := \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w_i$ für ein $i \in \mathbb{N}_+$ und M_i akzeptiert w_i nicht$\}$ ist nicht rekursiv (aufzählbar) (Diagonalisierung).
- Problem: Funktioniert nur für „künstliche" Sprachen.
- Kann $L_{\text{diag}} \notin \mathcal{L}_{\text{RE}}$ helfen, um für weitere Sprachen zu zeigen, dass diese nicht rekursiv aufzählbar sind?

Definition (Rekursiv Reduzierbar)

Für zwei Sprachen L_1, L_2 sagen wir dass $L_1 \leq_R L_2$ (L_1 ist rekursiv reduzierbar auf L_2) falls

$$L_2 \in \mathcal{L}_{\text{R}} \Longrightarrow L_1 \in \mathcal{L}_{\text{R}}.$$

Reduzierbarkeit

Definition (Rekursiv Reduzierbar)

Für zwei Sprachen L_1, L_2 sagen wir dass $L_1 \leq_R L_2$ (L_1 ist rekursiv reduzierbar auf L_2) falls

$$L_2 \in \mathcal{L}_{\mathrm{R}} \Longrightarrow L_1 \in \mathcal{L}_{\mathrm{R}}.$$

Theorem

Wenn L_1 nicht rekursiv ist und $L_1 \leq_R L_2$, ist auch L_2 nicht rekursiv.

Und wie zeigt man jetzt $L_1 \leq_R L_2$? Z.B. in dem man jede Instanz aus L_1 zu einer Instanz aus L_2 umbaut.

Reduzierbarkeit

Definition (EE-Reduzierbar)

Für zwei Sprachen L_1, L_2 sagen wir dass $L_1 \leq_{EE} L_2$ (L_1 ist EE-reduzierbar auf L_2) falls eine TM M existiert, so dass

$$x \in L_1 \iff f_M(x) \in L_2,$$

wobei f_M die von M berechnete Funktion ist.

Theorem

Wenn $L_1 \leq_{EE} L_2$, dann ist auch $L_1 \leq_R L_2$.

Reduzierbarkeit

Theorem

Wenn $L_1 \leq_{EE} L_2$, dann ist auch $L_1 \leq_R L_2$.



Abbildung 5.7

Reduzierbarkeit

Rekursive Reduktionen sind aber mächtiger als EE-Reduktionen:



Abbildung 5.8

Reduzierbarkeit

Aufgabe

Sei L_1 eine rekursive Sprache. Zeige dass dann

$$L_1 \leq_{EE} \{0\}\{0,1\}^*$$

gilt.

Gilt auch $L_1 \leq_{EE} \{0,1\}^*$?

Gilt auch $L_1 \leq_{EE} \emptyset$?

Gilt auch $L_1 \leq_{EE} L_{\text{diag}}$?

Reduzierbarkeit

Aufgabe

Sei L_1 eine rekursive Sprache. Zeige dass dann

$$L_1 \leq_{EE} \{0\}\{0,1\}^*$$

gilt.

Gilt auch $L_1 \leq_{EE} \{0,1\}^*$?

Gilt auch $L_1 \leq_{EE} \emptyset$?

Gilt auch $L_1 \leq_{EE} L_{\text{diag}}$?

Reduzierbarkeit

Aufgabe

Zeige

1. $L_H \leq_R (L_{\text{diag}})^{\complement}$
2. $(L_{\text{diag}})^{\complement} \leq_R L_H$

$$L_{\text{diag}} := \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w_i \text{ für ein } i \in \mathbb{N}_+ \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w \text{ nicht.}\}$$

$$L_H := \{\text{Kod}(M)\#x \mid x \in \{0,1\}^* \text{ und } M \text{ hält auf } w.\}$$